

Desinet-compact Konzentrat

Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

- ▶ EN-geprüftes und VAH-/IHO-gelistetes Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die Flächendesinfektion
- ▶ Frei von Aldehyden, Phenolen und metallorganischen Wirkstoffen
- ▶ Reinigungsaktiv und geruchsneutral
- ▶ Wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien (inkl. Salmonellen und Listerien), Hefen und behüllte Viren (begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV)
- ▶ Wirksam gegen SARS-CoV-2 (EN 14476, EN 16777)
- ▶ Geeignet zur Desinfektion von Acrylglas
- ▶ Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Einsatz im Lebensmittelbereich liegt vor



Anwendungsbereich

Zur Reinigung und Desinfektion von wasserbeständigen Boden-, Wand-, Decken- und Mobiliärflächen in hygienerelevanten Bereichen. Auch auf beschichteten Bodenbelägen anwendbar.

Anwendung

Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. 1 Dosierung = 25 ml.

Herstellen der Gebrauchslösung:

Lösung immer mit kaltem Wasser ansetzen! Dosierung siehe Tabelle. 2-L- und 5-L-Gebinde mit geeignetem Kiehl-Dosiersystem (z. B. DosiStation, Arcantec, DosiJet) verwenden.

Desinfizierende Reinigung:

Fläche mit Desinfektionslösung vollständig benetzen und mit Reinigungstextil oder Reinigungsgerät bearbeiten. Verbrauch: 0,1 ml/m².

Flächen und Küchengeräte, die direkt mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Trinkwasser spülen.



Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach (EU) 2019/771 Art. 2! Nur für professionelle Anwender mit entsprechender Sachkunde gemäß nationalen Verordnungen. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
DE: BAuA Reg.-Nr. N-72134, CH: Eidg. Zul. CHZN1588, PT 02, PT 04

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Nichtionische Tenside 5–15 %, wasserlösliche Lösungsmittel, Biozide.
pH-Wert (Konzentrat): ca. 9,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 7,5

Wirkstoffe in 100 g:

10,0 g Didecylmethylammoniumchlorid (CAS: 7173-51-5), 11,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (CAS: 2372-82-9), 14,5 g Phenoxyethanol (CAS: 122-99-6).

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Anzahl VPE je Palette
j350354	240 x 25 ml Dosierbeutel (Karton)	48
j350302	6 x 1 L Dosierflaschen (Karton)	84
j350308	3 x 2 L Flaschen (Karton)	530
j350305	2 x 5 L Kanister (Karton)	56

Desinet-compact Konzentrat

Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, GHS07, GHS08, GHS09, Gefahr. H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. Enthält: Didecyldimonium Chloride / Laurylamine Dipropylenediamine / Phenoxyethanol (INCI)

Prüfungen und Listungen

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im Gesundheitswesen

Prüfmethode	Wirksamkeitsspektrum	Belastung	Dosierung		Einwirkzeit
EN 16615 / 4-Felder-test VAH-zertifizierte Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion mit Mechanik	bakterizid / levurozid	hoch	0,5 %	50 ml/10 L	60 min
EN 16777 Quantitativer Oberflächenversuch	begrenzt viruzid*				

Dosierempfehlung für die Flächendesinfektion im industriellen, institutionellen und Lebensmittelbereich

Prüfmethode	Wirksamkeitsspektrum	Belastung	Dosierung		Einwirkzeit
EN 16615 Flächendesinfektion ohne Mechanik	bakterizid / levurozid	hoch	0,5 %	50 ml/10 L	60 min
EN 16777 Quantitativer Oberflächenversuch	begrenzt viruzid*				

Weitere Prüfungen

Prüfmethode	Wirksamkeits- spektrum	Belastung	Dosierung		Einwirkzeit
medizinischer Bereich					
EN 16615 / 4-Felder- test	bakterizid / levurozid	hoch	0,5 %	50 ml/10 L	15 min
EN 13727 Quantitativer Suspen- sionsversuch	bakterizid	hoch	0,5 %	50 ml/10 L	1 min
EN 13624 Quantitativer Suspen- sionsversuch	levurozid	hoch	0,5 %	50 ml/10 L	5 min

*gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004, siehe auch www.desinfektionsmittelliste.de

Desinet-compact Konzentrat

Aldehydfreies flüssiges Desinfektionsreiniger-Konzentrat

Prüfmethode	Wirksamkeits- spektrum	Belastung	Dosierung		Einwirkzeit
Viruzidie					
EN 14476 Quantitativer Suspen- sionsversuch	begrenzt viruzid*	gering	0,25 % 0,5 %	25 ml/10 L 50 ml/10 L	1 min 1 min
		hoch	0,5 %	50 ml/10 L	60 min
EN 16777 Quantitativer Oberflä- chenversuch	begrenzt viruzid*	hoch	0,5 %	50 ml/10 L	60 min
DWV/RKI Quantitativer Suspen- sionsversuch	begrenzt viruzid*	mit und ohne	0,25 %	25 ml/10 L	30 min
	Murines Norovirus (MNV)	mit und ohne	2 %	200 ml/10 L	120 min
		ohne	0,25 %	25 ml/10 L	15 min

*gemäß RKI-Empfehlung Bundesgesundheitsblatt 01-2004, siehe auch www.desinfektionsmittelliste.de